

正本

檔 號：

保存年限：

彰化縣政府 函

43247
台中市大肚區王田里興和路326號

地址：50001彰化市中山路2段416號
承辦人：陳木林
電話：04-7531688
電子信箱：mlchen03@email.chcg.gov.tw

受文者：台灣農業合作社聯合社

發文日期：中華民國106年1月3日

發文字號：府農務字第1050458000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

裝 附件：香蕉研究所原函(共1個電子檔)

主旨：惠請轉知轄下蕉農於蕉株抽穗期間進行花薊馬防治作業，以
避免香蕉水銹斑影響香蕉外觀品質，請查照。

說明：

- 一、依財團法人台灣香蕉研究所105年12月27日(105)台蕉研發字第2928號函辦理。
- 訂 二、檢附香蕉研究所原函。

正本：本縣各鄉鎮市農會、保證責任中華民國果菜合作社聯合社、台灣農業合作社聯合社

副本：本府農業處

線 縣長魏明谷

本案依分層負責規定授權主管科長決行

檔號：
保存年限：

財團法人台灣香蕉研究所 函

地址：904 屏東縣九如鄉玉泉村榮泰街 1 號
承辦人：蘇慶昌
電話：(08)7392111-3
傳真：(08)7390595
E-mail：mscccc@yghoo.com.tw

受文者：彰化縣政府
發文日期：中華民國 105 年 12 月 27 日
發文字號：(105)台蕉研發字第 2928 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：蕉株抽穗期間，籲請 蕉農務必適時做好花薊馬防治作業，並轉知農友參考警報防治內容避免香蕉水銹斑影響香蕉外觀優良品質，請 查照。

說明：

- 一、香蕉花薊馬蟲口整年均可發現，尤以 9 月至隔年 1 月為甚，以種植「寶島蕉」(新北蕉)及「台蕉 7 號」(玉泉)兩品種且逢蕉株抽穗蕉園者更為嚴重。倘若香蕉花苞抽出莖頂，尚未彎曲前疏忽花薊馬防治，易導致花薊馬侵入花苞，在香蕉幼果果皮上產卵及刺吸汁液，造成果皮外表出現許多卵斑及水銹疤痕，影響香蕉外觀品質至鉅。務請蕉農把握防治時機，及時進行田間花薊馬防治作業。
- 二、防治方法：每 3-5 天巡視蕉園 1 次，在花苞抽出莖頂前期或初彎前，選擇下列一種藥劑配方防治：
 - (一)、以 2.8% 第滅寧乳劑 3,000 倍液，噴施剛抽出莖頂或初彎下花苞，每隔 5 天噴施 1 次，共噴 3 次。
 - (二)、5% 陶斯松粒劑或 10% 福瑞松粒劑：每株 15 公克，分別撒施於第 1、2 葉鞘內，並於終花期前以 2.8% 第滅寧乳劑 3,000 倍液噴果房 1 次。
 - (三)、終花後切除花苞，減少蕉園花薊馬密度。
 - (四)、定期防除蕉園雜草，避免花薊馬滋生擴散。

正本：台灣香蕉、芒果外銷業者聯誼會、台灣省青果運銷合作社、台灣省青果運銷合作社高雄分社、屏東分社、台中分社、嘉南分社、東台分社、台灣區冷凍蔬菜工業同業公會、台中市政府農業局、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、台南市政府農業局、高雄市政府農業局、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府
副本：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、行政院農業委員會農糧署、本所農場

所長 趙治平